

عنوان مقاله:

بیماری ویروس کرونا (COVID-19) و بیماری سل: همه گیری مشترک

محل انتشار:

دوماهنامه پایش، دوره 19، شماره 6 (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 2

نویسندگان:

محمد واحدیان شاهرودی - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

پریسا رمضان نیا - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

هادی طهرانی - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

خلاصه مقاله:

سردبیر محترم همه گیری به عنوان بیماری تعریف می شود که در کل کشور ها یا درکل جهان گسترش می یابد. سل و بیماری ویروس کرونا (COVID-19) هر دو بیماری همه گیر هستند که انتقال مداوم و پایدار همه گیری در جامعه و در سرتاسر جهان را نشان می دهند. امروزه هیچ کشوری عاری از سل نیست و این احتمال وجود دارد که این مسئله به زودی برای COVID-19 روی دهد[1]. در حالی که سل یک بیماری همه گیر آهسته است و برای هزاره ها بشر را همراهی می کند، COVID-19 جدید بوده و به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. طی 3 قرن گذشته سل بارها به عنوان یک همه گیری شناخته شده است، در حالی که این اولین همه گیری COVID-19 است[2]. به نظر می رسد که سل یک بیماری مهم برای بدتر شدن وضعیت بالینی موارد COVID-19 است، و جداسازی موارد مبتلا به سل می تواند معیار مهمی برای به حداقل رساندن وقوع موارد شدید COVID-19 و بستری شدن در بیمارستان به دلیل بیماری در این جمعیت حتی در شرایط انزوا باشد. دسترسی به درمان سل باید تضمین شده و صورت منظم صورت پذیرد؛ به همین ترتیب، حتی اگر مطالعات هنوز در مرحله مقدماتی است، توصیه می شود اقدامات فاصله اجتماعی به طور واضح تری نسبت به افراد آلوده به TB انجام شود. به احتمال زیاد بیماران مبتلا به سل فعال زمان بیشتری برای قرار گرفتن در معرض عفونت COVID-19 به دلیل سیر مزمن سل دارند[3]...

کلمات کلیدی:

COVID-19، سل، همه گیری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1154475>

