

عنوان مقاله:

بررسی فراوانی علل انجام آمنیوستنز، نتایج و عوارض آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه همدان

محل انتشار:

چهارمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

زهرا صنائی - متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنان، همدان، ایران

شهره علیمحمدی - متخصص زنان، دانشیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

الهام منسوب بریحانیان - پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: در جهان سالیانه، میلیون ها نوزاد با ناهنجاری های مادرزادی متولد می شوند و ناهنجاری، ناهنجاری های مادرزادی از مهم ترین دلیل معلولیت و مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته محسوب می شود. با انجام آمنیوستنز و تهیه کاریوتایپ جنین، بسیاری از ناهنجاری های مادرزادی قابل پیشگیری هستند. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی، به روش سرشماری، تعداد ۲۳۶ مورد آمنیوستنز انجام شده در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان، از ابتدای مهر ۱۳۹۶ تا ابتدای مهر سال ۱۳۹۷ که واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند، از نظر علل انجام آمنیوستنز و نتایج و عوارض آن مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها پس از ثبت در چک لیست با نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ در سطح اطمینان ۹۵٪ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین و انحراف معیار سنی زنان 28 ± 3 / ۵۵ سال بود، غربالگری اول و دوم سندرم داون، سونوگرافی غیر طبیعی و سن بالا مهم ترین اندیکاسیون آمنیوستنز بودند. از ۲۳۶ آمنیوستنز انجام شده، ۱۲ مورد (۵٪) کاریوتیپ غیر طبیعی داشتند. در بین موارد غیر طبیعی، ترزومی ۲۱ با فراوانی ۵ (۶۷٪) شایع ترین ناهنجاری بود. بین نتیجه آمنیوستنز با علت درخواست، سن مادر و سوابق بارداری قبلی مادر ارتباط آماری معنی دار مشاهده نشد $P < 0.05$ نتیجه گیری: غربالگری اول و دوم سندرم داون، نوکال ترانسلسونسی (NT) و سن بالای مادر مهم ترین اندیکاسیون های آمنیوستنز و ترزومی شایع ترین ناهنجاری کروموزومی در جمعیت مورد مطالعه بود.

کلمات کلیدی:

آمنیوستنز، بارداری، علت، پیامد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1272176>

