

عنوان مقاله:

اثر وزن از شیرگیری بر روی عملکرد پرواری بره های نر افشاری

محل انتشار:

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسندگان:

محمدتقی مسلمیون - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

حمید امانلو - دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.

منوچهر منعم - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

سیدسعید موسوی - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

خلاصه مقاله:

اثر وزن از شیرگیری بر عملکرد پرواری بره های نر افشاری در آزمایشی با استفاده از 36 راس بره نر در سه گروه وزنی 24، 29 و 34 کیلوگرمی با سنین 5/3 و 5/4 و 5/5 ماهه (به ترتیب تیمارهای اول تا سوم) و با استفاده از یک جیره غذایی متوازن برای یک دوره 100 روزه پرواربندی پاییزه در استان زنجان، در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی تیمارها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر وزن شیرگیری بر روی وزن نهایی بره ها معنی دار بود ($P < 0.05$). کمترین مقدار ماده خشک مصرفی روزانه (59.1 ± 1.0 کیلوگرم) و بهترین ضریب تبدیل خوراک (44.6 ± 7.0) در تیمار اول مشاهده شد و اختلاف میانگین آنها با سایر تیمارها معنی دار بود ($P < 0.05$). افزایش وزن روزانه تیمارهای اول تا سوم به ترتیب، 4.249 ± 2.27 ، 5.229 ± 3.28 و 7.232 ± 7.32 گرم بود و بین تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. بر اساس نتایج آزمایش حاضر، وزن مطلوب از شیرگیری و شروع پرواربندی قابل توصیه برای بره های نر افشاری 24 کیلوگرم است.

کلمات کلیدی:

کلمات کلیدی: پروار بندی، گوسفند افشاری، وزن شیرگیری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/145757>

