

عنوان مقاله:

اختلال عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر استان بوشهر

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 2

نویسندگان:

پروین رندی راد - کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

راضیه باقرزاده - دانشیار بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

حکیمه واحدپرست - دانشیار پرستاری، گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

طیبه غریبی - مربی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

خلاصه مقاله:

مقدمه: بیماری عروق کرونر از شایع ترین بیماری های مزمن است که باعث مرگ و میر و ایجاد عوارض در افراد می شود. از جمله عوارض این بیماری تاثیر منفی بر کیفیت زندگی جنسی است که می تواند بر کل خانواده تاثیرگذار باشد. بررسی کیفیت زندگی جنسی در زنان که معمولاً از ابراز مشکلات جنسی خود شرم دارند بیشتر حائز اهمیت است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اختلال عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر استان بوشهر انجام گردید. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بود، که در سال ۱۴۰۰ روی ۳۸۵ نفر زن مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت، مطب پزشکان یا درمانگاه های تخصصی استان بوشهر با روش نمونه گیری آسان انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل ابتلا به حداقل یکی از بیماری های عروق کرونر، داشتن رضایت جهت شرکت در پژوهش، زندگی با همسر، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن؛ و معیارهای خروج شامل مدت بیماری کمتر از ۶ ماه و بودن در فاز حاد بیماری بودا اطلاعات با استفاده از فرم اطلاعات جمعیت شناختی و ایندکس عملکرد جنسی زنان جمع آوری شد. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS ویرایش ۱۹، و استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی شامل رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری در تمام موارد کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش: میانگین سنی مشارکت کنندگان در پژوهش ۱۵/۱۲ ± ۱۹/۵۲ و طول مدت ازدواج ۲۹/۱۴ ± ۷۱/۳۱ سال بود. اختلال عملکرد جنسی خفیف، متوسط و شدید به ترتیب در ۲۴/۹، ۱۹/۲ و ۲۰/۳ درصد از واحدهای پژوهش گزارش گردید. داشتن اختلال عملکرد جنسی قبل از بیماری (OR=۵/۶۰۸، P value=۰/۰۰۶) و یائسه بودن (OR=۴/۱۲۷، P value=۰/۰۰۱) شانس اختلال عملکرد جنسی را افزایش و اشتغال همسر در مشاغل بهداشتی-درمانی (OR=۵/۰۳۴، P value=۰/۰۰۴)، شانس اختلال عملکرد جنسی را کاهش می دهد. طول مدت بیماری با عملکرد جنسی (OR=۱/۰۵۱، P value=۰/۲۳۲) در ارتباط نبود. نتیجه گیری: بیش از ۶۰ درصد زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر، با درجاتی از اختلال عملکرد جنسی روبرو هستند؛ که یائسگیو داشتن مشکل جنسی قبل از بیماری شانس این اختلالات را افزایش میدهد. هنگام مراقبت از زنان با بیماری عروق کرونر، توجه به اختلال عملکرد جنسی به خصوص در زنانی که شانس بیشتری برای این اختلالات دارند باید مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

بیماری عروق کرونر، عملکرد جنسی، بیماری مزمن

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1596209>



