

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر کودهای زیستی و کشت مخلوط بر عملکرد علوفه چاودار و شبدر

محل انتشار:

همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

حامد ایمانی خواجه پاشا - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

محمود پوریوسف - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

عبدالله حسن زاده قورت تپه - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

خلاصه مقاله:

به منظور ارزیابی عملکرد چاودار در کشت باشبدر در سال زراعی سال 1389 در ایستگاه تحقیقات ساعتلو ارومیه انجام گرفت. آزمایشی به شکل فاکتوری با طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. شامل تیمار کودی الف: هیومیکا ب) کود زیستی فسفات بارور 2 ج) شاهد د) هیومیکا + کود زیستی فسفات بارور 2 نسبتهای کشت مخلوط شامل الف) 100 درصد شبدر، 75 درصد شبدر + 25 درصد چاودار، 50 درصد شبدر + 50 درصد چاودار، 25 درصد شبدر + 75 درصد چاودار و 100 درصد چاودار بود. کشت مخلوط به روش جایگزینی انجام شد. باتوجه به نتایج بدست آمده نشان داد که تیمار کودی هیومیکا بیشترین عملکرد علوفه را در بین تیمارهای کودی بیان نمود. تیمارهای مختلف شبدر + چاودار تأثیری در عملکرد علوفه تر و خشک نداشتند

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/161211>

