

عنوان مقاله:

عوامل تنش زای آسیب زنده در بخش مراقبت های پس از بیهوشی در سال ۱۳۹۷: مقایسه دیدگاه بیماران و پرستاران

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره 16، شماره 3 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

لیلا قنبری افرا - Trauma Nursing Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

آریتا ظاهری - Department of Anesthesia, School of Paramedical, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

اسما مهربان - Department of Anesthesia, School of Paramedical, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

معصومه دلارام - Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

فاطمه دریس - Department of Statistics and Epidemiology, Faculty of Statistics, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: واحد ریکاوری به طور بالقوه یک بخش پراسترس است. در نتیجه تجربه این استرسورها، واکنش های روانی و احساسی را از خود بروز می دهند که روی سلامتی، بهبودی و بازتوانی بیماران تاثیر منفی دارد. این مطالعه، ادراک بیماران و پرستاران واحدهای ریکاوری بیمارستان های آموزشی درمانی شهرکرد را در خصوص عوامل استرس زا موجود در سال ۱۳۹۷ مقایسه می کند. روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی ۶۰ پرستار و ۳۸۴ بیمار در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرکرد در سال ۱۳۹۷ انجام شد. روش نمونه گیری برای پرستاران سرشماری و بیماران با استفاده از فرمول حجم نمونه و در نظر گرفتن معیارهای ورود تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته عوامل تنش زای بیماران در واحد ریکاوری بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و آزمون های آمار توصیفی و همبستگی پیرسون و تیست تحلیل شد. یافته ها: میانگین کل عوامل تنش زا از دیدگاه پرستاران $50/67 \pm 50/5$ و از دیدگاه بیماران $52/68 \pm 50/12$ است ($P > 0/05$). بیماران و پرستاران درد و تشنگی را از مهم ترین عوامل استرس زا می دانند در حالی که گویه «رعایت نکردن حریم خصوصی بیماران» از نظر پرستاران اهمیت بالایی داشته است، اما بیماران آن را به عنوان کم اهمیت ترین استرسور گزارش کرده اند. نتیجه گیری: دیدگاه پرستاران و بیماران نسبت به ۱۰ عامل استرس زا میانگین تقریباً مشابهی داشت. با این حال، به نظر می رسد که پرستاران به آموزش بیشتری در ارزیابی عوامل استرس زای بیماران و همچنین کاهش یا از بین بردن آن ها نیاز دارند.

کلمات کلیدی:

Post-anesthesia care, Trauma and stressor-related disorders, Nurses, Patients
مراقبت های پس از بیهوشی؛ اختلالات مربوط به تروما و استرس؛ پرستاران؛ بیماران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1627244>



