

عنوان مقاله:

مقایسه سرسختی روانشناختی در افراد مبتلا به دیابت نوع II با افراد غیر مبتلا

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روانشناسی (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسندگان:

صمد درویشی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی . دانشگاه آزاد بروجرد، بروجرد، ایران

مهران فرهادی - استاد یار دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران

مهدی روزبهانی - استاد یار دانشگاه آزاد بروجرد، بروجرد، ایران

خلاصه مقاله:

زمینه وهدف: با توجه به شیوع روزافزون بیماری دیابت نوع II هدف از انجام این پژوهش مقایسه سرسختی روانشناختی در افراد مبتلا به دیابت نوع II با افراد غیر مبتلا بوده است. روش ها: در این پژوهش علی - مقایسه ای (پس رویدادی)، از کلیه افراد بزرگسال ۲۵ تا ۶۰ سال مبتلا به بیماری دیابت نوع II و همراهان آنها که به مرکز دیابت شهر همدان مراجعه کرده بودند، با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند تعداد ۹۱ نفر انتخاب شدند. از این تعداد ۴۴ نفر مبتلا به بیماری دیابت نوع II و تعداد ۴۷ نفر سالم بر اساس معیارهای ورود، انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا (۱۹۷۹) بود، که داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و آماراستنباطی و تحلیل واریانس چند متغیری (Manova) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها بیانگر آن بود که از بین سه مولفه سرسختی روانشناختی، مولفه های کنترل و مبارزه جویی با بیماری دیابت نوع II تفاوت معنا دار داشتند ($P < 0/001$). اما در مولفه سرسختی (تعهد)، تفاوت معناداری بین بیماران دیابتی نوع II و افراد غیر دیابتی دیده نشد ($P > 0/05$). نتیجه گیری: سرسختی روانشناختی می توانند به عنوان عامل ایجاد کننده یا مستعدساز و یا تشدیدکننده در دیابت نوع II باشد.

کلمات کلیدی:

دیابت نوع II ، سرسختی روانشناختی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1640479>

