

عنوان مقاله:

گزارش یک مورد نادر تومور متاستاتیک ولو با منشا کلیوی

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 19، شماره 17 (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

ملیحه حسن زاده مفرد - دانشیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ انکولوژی زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

فائزه جعفریان - دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

لعیا شیرین زاده - دستیار فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: سرطان ولو، اولیه یا متاستاتیک، یک تومور نادر است که کمتر از ۱٪ سرطان های زنان را شامل می شود. سرطان های ولو اولیه مسئول ۳-۵٪ تومورهای تناسلی هستند، در حالی که سرطان های متاستاتیک ولو شیوع کمتری دارند و ۸-۵٪ سرطان های ولو را شامل می شوند. تمام دستگاه تناسلی مونث در خطر متاستاز از ارگان های تناسلی و خارج تناسلی است. در بین ارگان های تناسلی، ولو کمترین میزان متاستاز را دارد. منشا متاستازها در ۹۴٪ از سایر ارگان های تناسلی و در ۱/۵۳٪ غیرتناسلی است. در موارد غیر تناسلی، آدنوکارسینوم گوارشی از همه شایع تر است. متاستاز از مناطق دوردست خارج از دستگاه تناسلی مانند کلیه، معده، کوریوکارسینوم حاملگی، ملانوم بدخیم و نوروبلاستوم به ولو گزارش شده است. متاستاز با منشا اوروتلیال شیوع کمتری دارد که در مقاله حاضر یک مورد متاستاز از کلیه به ولو بررسی شد. معرفی بیمار: بیمار خانم ۵۶ ساله با سابقه سرطان کلیه با توده زخمی ولو مراجعه کرد. بیوپسی ولو متاستاز ناشی از کارسینوم کلیوی گزارش شد. بیمار تحت رزکسیون موضعی ضایعه و کموتراپی قرار گرفت. نتیجه گیری: نتیجه اصلی این مطالعه، در نظر داشتن ظن بالینی بالا برای متاستاز ولو در زنان با سابقه قبلی سرطان است که با ضایعه ولو مراجعه می کنند. تشخیص سریع و درمان مناسب می تواند پروگنوز این بیماران را تحت تاثیر قرار دهد.

کلمات کلیدی:

سرطان ولو، کارسینوم سلول کلیه، متاستاز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1728096>

