

## عنوان مقاله:

مقایسه تشخیص های بالینی بیماران بستری و سرپایی مبتلا به PTSD با آزمون های روان شناختی

## محل انتشار:

مجله طب نظامی، دوره 6، شماره 3 (سال: 1383)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسندگان:

جعفر میرزایی

غلامرضا کرمی

جواد عاملی

محمدعلی همتی

## خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان هماهنگی تشخیصی مصاحبه های روانپزشکی با پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا MMPI و مصاحبه PTSD است. بررسی شاخص های روایی و بالینی MMPI و شدت PTSD از دیگر اهداف پژوهش حاضر می باشد. روش کار. این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس بر روی ۲۰ نفر از جانبازان مبتلا به PTSD سرپایی و ۲۰ نفر بستری صورت گرفته است. در ابتدا با ایشان مصاحبه روانپزشکی شده و سپس پرسشنامه MMPI و مصاحبه PTSD به همراه جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی اخذ گردید و پس از آن گروه ها با هم مقایسه گردید. نتایج. در این پژوهش نشانگان اصلی اختلال استرس پس از ضربه شامل: شاخص های رویای مربوط به ضربه، گوش به زنگ بودن و واکنش از جا پریدن و کاهش شدید علاقه و اشکال در به خواب رفتن بوده و در نمونه بستری بیشترین نمره را کسب کردند. شاخص های تحریک پذیری، محدود شدن طیف عواطف، فلاش بک، اشکال در تمرکز و واکنش های فیزیولوژیک نمرات بالایی را در نمونه سرپایی به دست آوردند. در ضمن در مورد مقیاس های روایی و بالینی MMPI به جز مقیاس های K-Hs-Ma در دو گروه بستری و سرپایی تفاوت معنی داری در سایر مقیاس ها مشاهده نشد. بحث. بر اساس یافته های این تحقیق، هماهنگی بین مصاحبه های بالینی با پرسشنامه MMPI و مصاحبه PTSD وجود دارد. در حالی که در بیشتر مقیاس های MMPI بین دو گروه بستری و سرپایی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

## کلمات کلیدی:

اختلال استرس پس از ضربه، پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا MMPI، مصاحبه PTSD واتسون

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1735862>

