

عنوان مقاله:

بررسی عوارض گزارش شده متعاقب واکسیناسیون همگانی سرخک، سرخچه در شهرستان بیرجند (سال ۱۳۸۲)

محل انتشار:

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 11، شماره 1 (سال: 1382)

تعداد صفحات اصل مقاله: 0

نویسندگان:

زهرة آذرکار

فاطمه طاهری

غلام رضا شریف زاده

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: در کشور ما واکسیناسیون همگانی سرخک، سرخچه (MR) در آبان ماه سال ۱۳۸۲ برای گروه سنی ۵ تا ۲۵ سال انجام شد. یکی از مسائل مهم در جریان واکسیناسیون همگانی عوارض ناشی از واکسن است. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوارض گزارش شده پس از بسیج همگانی واکسیناسیون در جمعیت واکسینه شده شهرستان بیرجند انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی و توصیفی تحلیلی، جامعه مورد پژوهش افراد واکسینه شده در طرح واکسیناسیون سرخک، سرخچه شهر بیرجند بود. از این جامعه، افرادی که دچار عارضه شدند و عوارض آنها توسط رابطین بهداشتی در فرم مربوطه ثبت شده بود، براساس متغیرهای سن، جنس، نوع عارضه و زمان بروز آن، مکان واکسیناسیون، اقدامات درمانی و وضعیت نهایی واکسینه شده بررسی گردید؛ اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری χ^2 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از مجموع ۱۶۳۳۲۳ فرد واکسینه شده، عارضه در ۹۸ مورد گزارش و ثبت شد. ۲/۶۱٪ عوارض در زنان و ۸/۳۸٪ در مردان بود؛ از نظر گروه سنی بیشتر عوارض در گروه سنی ۵ تا ۱۵ سال (۶/۶۱٪) بود. ۲/۵۹٪ موارد ساکن شهر و ۸/۴۰٪ ساکن روستا بودند. شایعترین عوارض شامل تهوع و استفراغ ۴۵ مورد (۹/۴۵٪)، سردرد ۴۲ مورد (۸/۴۲٪)، سرگیجه و بیقراری ۳۹ مورد (۹/۳۹٪) و تب ۳۶ مورد (۷/۳۶٪) بود. ۹۸٪ افراد به صورت سرپایی درمان شده بودند و در ۹/۹۵٪ بهبودی کامل داشتند. نتیجه گیری: عوارض گزارش شده به دنبال واکسیناسیون همگانی MR در شهرستان بیرجند بسیار ناچیز و عمدتاً از نوع خفیف و با بهبودی کامل بود.

کلمات کلیدی:

واکسن سرخک، سرخچه (MR)، بسیج همگانی، عوارض

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1781270>

