

عنوان مقاله:

تاثیر هیپنوتیزم بر پیامد های بارداری و زایمان: یک مطالعه مروری سیستماتیک

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 30، شماره 194 (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسندگان:

رقیه خاتون عرب - MSc Student in Consultation in Midwifery, Student Research committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

مهدی پوراصغر عربی - Associate Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

صغری خانی - Associate Professor, Sexual and Reproductive Health Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

محمد خادملو - Associate Professor, Department of Community Medicine, Orthopedic Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

زهرا رحمانی - Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

ذلیخا عطارد - Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

زینب نظری - Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: عوامل مختلفی بر درد، احساسات و هیجان‌ات مادر در دوران بارداری تاثیر دارند و این عوامل، نقش مهمی در تصمیم‌گیری روش ختم بارداری و کاهش عوارض بارداری دارند. مطالعه حاضر به صورت نظام مند و به منظور مروری بر تاثیر هیپنوتیزم بر پیامدهای بارداری و زایمان انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری سیستماتیک، پس از جستجوی مقالات، بدون محدودیت زمانی در پایگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، Google Scholar، PubMed، Web of Science، Scientific Information Database (SID)، Cochrane Library، Scopus، Magiran، Registry of Clinical Trial ((IRCT، و حذف موارد غیر مرتبط، کیفیت ۲۱ مطالعه انگلیسی توسط Jadad مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت ۱۳ مطالعه وارد متا آنالیز شد. برای بررسی هتروژنیته از آزمون کوکران Q و I²، و جهت آنالیز از نرم افزار STATA ۱۱ استفاده گردید. یافته‌ها: جمع بندی یافته‌های مطالعات، منجر به تشکیل شش طبقه در مورد تاثیر هیپنوتیزم بر پیامدهای بارداری شد. این موارد شامل، هیپنوتیزم موجب کاهش مصرف داروهای کاهنده درد می‌شود (P=۰۰۱/۰، OR=۲۱/۰، CI%۹۵: ۱۲/۰- ۳۸/۰)، (P=۰۸۲/۰، هیپنوتیزم موجب کاهش مصرف اکسی‌توسین نمی‌شود (P=۰۸۸/۰)، هیپنوتیزم موجب کاهش زایمان سزارین نمی‌شود (P=۰۳۲/۰، هیپنوتیزم موجب افزایش میزان زایمان طبیعی می‌شود (P<۰۰۱/۰، CI%۹۵: ۷۵/۱- ۳۲/۵) P،

OR=۰۶/۳)، هیپنوتیزم موجب کاهش میزان زایمان زودرس نمی شود ($P=۰۵۱/۰$) و هیپنوتیزم موجب افزایش نمره آپگار نوزاد نمی شود ($P=۰۲۷/۰$)، می باشد. استنتاج: انجام هیپنوتیزم می تواند موجب کاهش مصرف داروهای کاهنده درد زایمان و همچنین افزایش زایمان طبیعی گردد.

کلمات کلیدی:

Cesarean, delivery, pregnancy, hypnosis, self- hypnosis, labor pain, سزارین, زایمان, بارداری, هیپنوتیزم, خود هیپنوتیزمی, درد زایمان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1784390>

