

عنوان مقاله:

بررسی بار مراقبتی مراقبان خانگی بیماران مبتلا به کووید-۱۹

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 32، شماره 208 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

حکیمه ابراهیمی - *MSc Student in Critical Care Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

اکرم ثناگو - *Associate Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

ناصر بهنامپور - *Assistant Professor, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

لیلا جویباری - *Professor, Nursing Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ بستری در منزل، عمدتاً بر دوش خانواده می باشد، که این امر منجر به تحمل فشار مراقبتی می گردد. بار مراقبتی به درد روانی، مشکلات جسمی، فشارهای مالی و اجتماعی، اختلال در روابط خانوادگی، احساس ناامیدی و سایر نتایج منفی وظایف مراقبت اشاره دارد. هدف از این مطالعه تعیین بار مراقبتی در مراقبین خانگی بیماران مبتلا به کووید-۱۹ بستری در منزل بود. مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی، توصیفی- تحلیلی، ۳۹۰ مراقب خانگی بیماران مبتلا به کووید-۱۹ مراجعه کننده به مراکز درمانی/ بهداشتی شهر گرگان در سال ۱۴۰۰ با روش نمونه گیری در دسترس مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه بار مراقبتی نواک و گست (CBI)، دارای پنج حیطه و دامنه نمره ۱۲۰-۲۴ جمع آوری شد. برای تحلیل داده از آزمون های ناپارامتریک معادل و SPSS نسخه ۱۸ استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره کل بار مراقبتی $52/70 \pm 17/30$ و میانگین حیطه های وابسته به زمان $14/90 \pm 6/22$ ، تحولی $10/80 \pm 4/88$ ، جسمانی $9/60 \pm 4/36$ ، اجتماعی $7/80 \pm 2/91$ ، احساسی $9/60 \pm 3/84$ بود. با افزایش سن مراقبان، بار مراقبتی وابسته به زمان تشدید شد. زنان و مراقبان با تحصیلات کم تر از دیپلم، بار مراقبتی بیش تری را متحمل شدند. بین بار مراقبتی با وضعیت اقتصادی بیمار و وضعیت سلامتی مراقب ارتباط معنی دار وجود داشت ($P < 0/05$). استنتاج: مراقبان خانگی بیماران کووید-۱۹ بستری در منزل، بار مراقبتی در حد متوسط را متحمل شدند که می تواند اثرات منفی بر سلامت و رفاه آنان بگذارد. ضروری است مراقبین خانگی مورد حمایت روانی- اجتماعی و مالی از جانب سیستم های سلامت رسمی جامعه قرار گیرند.

کلمات کلیدی:

COVID-۱۹، caregivers، caregiver burden، family، patient care، کووید-۱۹، مراقبین خانگی، بار مراقبتی، خانواده، مراقبت از بیمار

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1784983>



