

عنوان مقاله:

بررسی عوامل پیش بینی کننده اختلال استرس پس از سانحه در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ ترخیص شده از بیمارستان

محل انتشار:

فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، دوره 9، شماره 2 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 0

نویسندگان:

زهره علیپور - Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

طاهره نصرآبادی - Department of nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

لادن فتاح مقدم - Department of psychiatric nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: عوارض روان شناختی بعد از ابتلا به کووید-۱۹ می تواند بسیار مخرب بوده و تهدیدکننده ی زندگی این بیماران حتی بعد از بهبودی باشد. یکی از این عوارض اختلال استرس پس از سانحه می باشد. مطالعه ی حاضر باهدف تعیین ارتباط علائم اختلال استرس پس از سانحه با عوامل پیش بینی کننده آن در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ ترخیص شده از بیمارستان انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی از نوع مقطعی بود که بر روی بیماران مبتلا به کووید-۱۹ ترخیص شده از بیمارستان امام خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، در نیمه ی دوم سال ۱۴۰۰ انجام شد. ۲۷۰ بیمار از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی بیماران و سنجش اختلال استرس پس از سانحه PCL استفاده شد. یافته ها: ۵۹/۳ درصد بیماران مورد پژوهش، خانم و ۵۷/۸ درصد از آن ها متاهل بودند. ۴۶/۳ درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند. ۳۵/۹ درصد از آن ها خانه دار بوده و ۹۴/۸ درصد بیماران مورد پژوهش بیمه داشتند. تب (۶۹/۳ درصد)، پایین افتادن سطح اکسیژن خون (۶۹/۳ درصد)، سرفه (۶۸/۵ درصد) و تنگی نفس (۶۴/۴ درصد) شایع ترین علائم ابتلا به بیماری کووید-۱۹ بودند. میانگین اختلال استرس پس از سانحه $40/25 \pm 5/98$ (در حد متوسط) بوده و سن بالا، تب، سرفه، ابتلا به دیابت، فوت نزدیکان و تراکتوستومی مهم ترین عوامل مرتبط با اختلال استرس پس از سانحه بیماران بهبودیافته از بیماری کووید-۱۹ بودند. نتیجه گیری: میزان اختلال استرس پس از سانحه بیماران بهبودیافته از بیماری کووید-۱۹ در حد متوسط بود که نیازمند این است پرستاران حتی بعد از ترخیص از بیمارستان و بهبودی، پیگیر این بیماران باشند. همچنین در امر مراقبت و انجام مداخلات مناسب برای این بیماران حتما به عوامل مرتبط با شدت این عارضه توجه نمایند.

کلمات کلیدی:

Post Traumatic Stress Disorder, COVID-۱۹, Patients, Hospital, اختلال استرس پس از سانحه, کووید-۱۹, بیمار, بیمارستان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1859777>

