

عنوان مقاله:

بررسی شیوع و عوامل موثر بر علائم افسردگی پس از زایمان ۶ ماه قبل و ۶ ماه بعد از آغاز همه گیری کووید ۱۹: یک مطالعه تحلیلی - مقایسه ای

محل انتشار:

دوماهنامه پایش، دوره 23، شماره 1 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

صدیقه کربلایی - *Department of Reproductive Health and Midwifery, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran*

می نور لمیعیان - *Department of Reproductive Health and Midwifery, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran*

محمد اسلامی - *Ministry of Health, Treatment and Medical Education, Tehran, Iran*

لیلا صاحبی - *Maternal, Fetal and Neonatal Research Center, Family Health Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

سحر انصاری - *Psychosomatic Medicine Research Center, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Iran*

خلاصه مقاله:

مقدمه: علائم افسردگی در زنان پس از زایمان شایع است و علائم بیشتر افسردگی با نگرانی بیشتر در مورد تهدیدات کووید-۱۹ برای زندگی مادر و نوزاد مرتبط است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه شیوع و عوامل موثر بر علائم افسردگی پس از زایمان در ۶ ماهه قبل و ۶ ماهه بعد از آغاز همه گیری (پاندمی) کووید-۱۹ انجام شد. مواد و روش کار: این پژوهش مقایسه ای قبل و بعد روی تعداد ۳۹۷۲۴ زنان پس از زایمان در ۶ ماهه قبل از همه گیری کووید-۱۹ و تعداد ۶۱۰۰ زنان پس از زایمان در ۶ ماهه بعد از آغاز همه گیری کووید-۱۹ انجام شد. اطلاعات از سامانه یکپارچه بهداشت کشوری وزارت بهداشت اخذ شده و داده ها در نرم افزار SPSS ۲۲ تحلیل شد. یافته ها: شیوع علائم افسردگی پس از زایمان، ۶ ماهه قبل و ۶ ماهه بعد از آغاز همه گیری کووید-۱۹ به ترتیب ۹/۱٪ و ۶/۲٪ برای اولین بار در ایران به دست آمد. در تعیین عوامل موثر بر علائم افسردگی پس از زایمان، در ۶ ماهه قبل از همه گیری کووید-۱۹ متغیرهای سن، شاخص توده بدنی، سابقه مرگ نوزاد، بارداری ناخواسته، تعداد زایمان در سطح ۲ و ۳ و بیشتر از ۳ زایمان با علائم افسردگی پس از زایمان ارتباط آماری معنی دار نشان داد. در ۶ ماهه بعد از آغاز همه گیری کووید-۱۹، بین متغیرهای تحصیلات، بارداری ناخواسته، تعداد زایمان ۳ و بیشتر از ۳ با علائم افسردگی پس از زایمان ارتباط آماری معنی دار نشان داد. براساس آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه، همه گیری کووید ۱۹ علائم افسردگی پس از زایمان را افزایش داده است. نتیجه گیری: با استفاده از یافته های حاصل در راستای پیش بینی و مدیریت عوارض ناشی از علائم افسردگی پس از زایمان می توان احتمال این عوارض و عواقب بعدی آنها را کاهش داد.

کلمات کلیدی:

postpartum depression, symptoms, prevalence of depression symptoms, related factors, COVID-۱۹ pandemic
افسردگی پس از زایمان، علائم، شیوع، عوامل مرتبط، همه گیری کووید-۱۹

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1905957>

