

عنوان مقاله:

خطر پذیری مصرف سیگار در نوجوانان: ارائه مدل تعاملی نظارت والدینی و هم نشینی با همسالان منحرف

محل انتشار:

فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 9، شماره 1 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

جواد خدادی سنگده - دانشگاه خوارزمی-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-گروه مشاوره-دانشجوی دکتری

علی محمد نظری - دانشگاه خوارزمی-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-گروه مشاوره-دانشیار

خدا بخش احمدی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله -دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-مرکز تحقیقات علوم رفتاری-دانشیار

مصطفی خانزاده - دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-گروه روانشناسی- دانشجوی دکتری

خلاصه مقاله:

مقدمه: نوجوانی مرحله حساسی برای شروع رفتار پرخطر مصرف سیگار محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نظارت والدینی و هم نشینی با همسالان منحرف و مصرف سیگار نوجوانان صورت گرفته است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه تیم نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران بود که 1241 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس های خطرپذیری نوجوانان ایرانی، نظارت والدینی و هم نشینی با همسالان منحرف استفاده شد. داده ها با استفاده از شاخص های آماری همبستگی[†] مستقل و مدل سازی معادلات ساختاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این نتایج: نتایج پژوهش نشان داد بین پسران و دختران به خطرپذیری مصرف سیگار تفاوتی وجود ندارد، میزان نظارت والدینی که دختران و میزان هم نشینی با همسالان منحرف در پسران بیشتر بود. نظارت والدین یا از طریق هم نشینی با همسالان دارای تأثیر معنادار بر مصرف سیگار می باشد و مدل واسطه ای ارائه شده قادر است 10% از واریانس مصرف سیگار را تبیین می کند. نتیجه گیری: توجه جدی به نقش نظارت والدینی در کاهش هم نشینی با همسالان منحرف و به دنبال آن کاهش احتمال خطر پذیری مصرف سیگار از سوی نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلمات کلیدی:

نوجوانی، نظارت والدینی، هم نشینی با همسالان، مصرف سیگار

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/443983>

