

عنوان مقاله:

شناسایی و پراکنش خارپوستان مناطق بین جزر و مدی بندرلنگه

محل انتشار:

ششمین همایش علوم و فنون دریایی (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

آریا اشجع اردلان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده علوم و فنون دریایی

جعفر سیف آبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده علوم و فنون دریایی

مرجان کریم زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده علوم و فنون دریایی

خلاصه مقاله:

خارپوستان یکی از شاخه های نسبتا پر تنوع بی مهران با تنوعی در حدود 6000 گونه زنده می باشند. به منظور شناسایی این آبزیان در سواحل بندرلنگه 3 ایستگاه شامل بندرمعلم-بستانه و لنگه انتخاب گردید. نمونه برداری بصورت فصلی از زمستان 1383 تا پاییز 1384 انجام گرفت. نمونه های شناسایی شده مربوط به چهار رده از خارپوستان بودند. که به ترتیب از نظر تنوع گونه های بدست آمده رده های شناسایی شده عبارت بودند از: Ophiuroidea- Echinoidea-Holothuroidea and Asteroidea که 12 گونه را شامل می شدند. بیشترین فراوانی مربوط به منطقه بستانه و کمترین فراوانی در منطقه بندر معلم بدست آمد. بزرگترین نمونه بدست آمده از نظر اندازه گونه ایی خیار دریایی *Holothoria atra* با طول 35 سانتی متر و قطر 5/5 سانتی متر بود.

کلمات کلیدی:

شناسایی ، خارپوستان ، بندرلنگه ، خلیج فارس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/5070>

