

عنوان مقاله:

Evaluate the association between Tamoxifen use and gallstone formation in breast cancer patients

محل انتشار:

نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

Azam askari - Breast clinic, Motahari Polyclinic, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

abbas rezaianzadeh - Breast clinic, Motahari Polyclinic, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

abdolrasul talei - Breast clinic, Motahari Polyclinic, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

sedigheh tahmasebi - Breast clinic, Motahari Polyclinic, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: در دنیای صنعتی امروز سرطان پستان یکی از شایعترین سرطان هادرزنان بشمار می رود که روزانه منجر به مرگ تعداد قابل توجهی از مبتلایان در جهان می شود . دلایل قطعی سرطان پستان ناشناخته است اما تحقیقات نشان می دهد که با بالا رفتن سن در زنان خطر ابتلاء هم بیشتر می شود . وقتی تشخیص سرطان پستان داده شد نوع درمان مورد نیاز از روی مرحله بالینی بیمار تعیین می گردد . یکی از داروهای مورد استفاده تاموکسیفن می باشد . از این دارو به عنوان درمان کمکی در بیماران مبتلا به گیرنده استروژن و یا پروژسترون مثبت استفاده می شود . با توجه به اینکه تاموکسیفن در تشکیل سنگهای صفراوی دخیل است. در این مطالعه ارتباط مصرف تاموکسیفن با تشکیل سنگ کیسه صفرا در بیماران سرطان پستان مورد مطالعه قرار گرفته است. اهداف مطالعه: بررسی ارتباط مصرف تاموکسیفن و تشکیل سنگ کیسه صفرا در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مجتمع درمانی شهید مطهری شیراز. روش مطالعه: از تعداد 2200 پرونده مورد بررسی 1160 نفر در سن مصرف تاموکسیفن بوده اند و از این تعداد 975 نفر به دلایل داشتن ریسک فاکتور سنگ کیسه صفرا یا ناقص بودن پرونده و ... از مطالعه حذف شدند و تعداد 185 پرونده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج: میانگین سن افراد مورد مطالعه 42/63 - 5/59 و میانگین شاخص توده بدنی 27/66 - 6/44 و میانگین تعداد فرزندان 2/96 - 1/71 و میانگین مصرف قرصهای بارداری 58/84 - 60/39 و میانگین مصرف سیگار در خانواده 8 - 10/44 و میانگین مصرف قلیان در خانواده 2/73 - 1/96 بوده است . از 2 نفری که قبل از مصرف تاموکسیفن سونوگرافی شکم طبیعی داشته اند 1 نفر بعد از 55 ماه بطور میانگین به سنگ کیسه صفرا مبتلا شده اند . نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع سنگ کیسه صفرا در نمونه های مورد بررسی 1/69٪ با حدود اطمینان 95٪ (3/59 - 0) برابر آورد گردید

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/713090>

