

## عنوان مقاله:

مقایسه مقدماتی عملکرد و خصوصیات زراعی توده های ریحان بنفش در استان مازندران

## محل انتشار:

نهمین کنگره علوم باغبانی ایران (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

## نویسندگان:

ناهید آملی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران- بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

جلال مهدوی ریکندی - دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد کشاورزی کرج.

## خلاصه مقاله:

به منظور دستیابی به جمعیت مطلوب ریحان بنفش، با عملکرد بالا در مازندران، تعدادی از جمعیت های موجود شامل، جمعیت پیشرفته ریحان بنفش در مازندران و توده اولیه آن، جمعیت پیشرفته قایم شهر، جمعیت پیشرفته نکا، جمعیت پیشرفته بهشهر، جمعیت پیشرفته بهنمیر، جمعیت پیشرفته فرح آباد، توده دستگرد اصفهان، توده مبارکه (خمینی شهر) اصفهان، توده نجف آباد، توده اردستان، توده بنفش درچه ارزیابی درآزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت یک سال ارزیابی شدند. برداشت و تعیین عملکرد ازدوخت میانی انجام شد. درطول دوره زراعی علاوه بر مراقبت های زراعی یادداشت برداری ها لازم در این بررسی صفات مختلفی از جمله، تعداد چین برداشت، ارتفاع بوته قبل از شروع گلدهی، تعداد برگ هر بوته، تعداد ساقه های فرعی، وزن برگ، نسبت وزن برگ به ساقه، عملکرد سبزینه ای شامل وزن تر اندازه گیری شده محاسبات آماری بر روی عملکرد صفات مورد نظر و مقایسه میانگین ها به روش دانکن صورت گرفت. در پایان ریحان بنفش خالص شده قایم شهر با میانگین عملکرد 33/57 تن در هکتار، برتری نسبت به سایر جمعیت ها نشان داد. این جمعیت وارد پروژه های سازگاری و ترویجی خواهد شد

## کلمات کلیدی:

جمعیت پیشرفته، ریحان بنفش، عملکرد

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/724304>

