

عنوان مقاله:

بررسی فراوانی و علل خونریزی داخل مغزی در نوزادان بستری شده در بیمارستان های شهر کاشان، سال های 1375-79

محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره 6، شماره 3 (سال: 1381)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

زیبا مسیبی - گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

امیرحسین موحدیان - گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

محسن خضری - گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت خونریزی داخل مغزی در نوزادان که با مرگ و میر بالا و عوارض عصبی شدیدی همراه است و عدم اطلاع از شیوع و علل خونریزی داخل مغزی در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان های کاشان، این تحقیق در سال های 1375-79 انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه گذشته نگر بر روی 2755 نوزاد بستری شده انجام گرفت. پس از تایید خونریزی داخل مغزی، اطلاعات مورد نظر از قبیل سن حاملگی، جنس علایم بالینی، نوع زایمان، ریسک فاکتورهای مادری و نوع خونریزی، علت خونریزی از پرونده ها استخراج و در پرسشنامه مربوط ثبت شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در میان نوزادان بستری، 62 مورد خونریزی داخل مغزی وجود داشت که 42 مورد در نوزادان نارس و 20 مورد در نوزادان ترم بوده است. مهم ترین علت خونریزی در نوزادان نارس، آسفیکیسی و در نوزادان ترم تروما بوده. شایع ترین خونریزی در نوزادان نارس خونریزی داخل بطنی و در نوزادان ترم خونریزی ساب دورال به حساب می آید. ارتباط معنی دار بین خونریزی داخل مغزی و جنس نوزاد و نوع زایمان مشاهده نشد. شایع ترین علامت بالینی در نوزادان مبتلا، کاهش رفلکس مورو بوده و مهم ترین ریسک فاکتور مادری که خطر خونریزی داخل مغزی را افزایش داده بود پره اکلامپسی می باشد. نتیجه گیری و توصیه ها: باتوجه به این که خونریزی داخل مغزی در نوزادان نارس 27 برابر نوزادان ترم بوده است و از طرف دیگر مهم ترین علت به وجودآورنده آن نیز آسفیکیسی بود باید تلاش بیشتری در جهت پیشگیری از زایمان های پره ترم و بروز آسفیکیسی انجام داد.

کلمات کلیدی:

خونریزی داخل مغزی، آسفیکیسی، تروما، نوزاد نارس، نوزاد ترم

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/946899>

