

## عنوان مقاله:

مقایسه کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندروم حاد کرونری

## محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره ۱۸، شماره ۵ (سال: ۱۳۹۳)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۸

## نویسندگان:

زهره رهنما - دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

محسن تقدسی - مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

مجید مازوچی - استادیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

## خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: بهبود کیفیت زندگی مهمترین هدف مداخلات درمانی در بیماریهای مزمن قلمداد میگردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نتایج استفاده از روشهای درمانی مختلف بر کیفیت زندگی مبتلایان به سندروم حاد کرونری انجام شده است. مواد و روشها: مطالعه گروهی حاضر بر روی مبتلایان به سندروم کرونری حاد بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال ۱۳۹۲ با نمونه های در دسترس انجام شد. کیفیت زندگی بیمارانی که طبق معیارهای درمانی با نظر متخصص قلب، تحت یکی از روشهای درمانی دارویی، آنژیوپلاستی یا پیوند عروق قرار گرفتند، با استفاده از پرسشنامه SF۳۶ (Short-form ۳۶) قبل و دو ماه بعد از دریافت درمان های فوق ارزیابی شد. نتایج: تعداد ۱۶۷ بیمار با میانگین سنی ۵۶/۵±۱۰/۲۲ سال مورد مطالعه قرار گرفتند و ۵۰/۳ درصد آنها زن بودند. آنژیوپلاستی و درمان دارویی، نمره ابعاد سلامت عمومی، درد بدنی و نمره کل کیفیت زندگی بیماران را افزایش داد. درمان دارویی نیز بر بعد فعالیت اجتماعی تاثیر مثبت داشت (P=۰/۰۱). پیوند عروق کرونر بعد ایفای نقش را بهبود بخشید (P=۰/۰۰۵) ولی موجب بهبود کیفیت کلی زندگی دوماه پس از درمان نشد. در مقایسه کیفیت کلی زندگی سه گروه درمانی دارویی، آنژیوپلاستی و پیوند عروق کرونر اختلاف معنی دار مشاهده نشد (P=۰/۶۷). نتیجه گیری: درمان های مختلف سندروم حاد کرونری در کیفیت زندگی این بیماران موثر بوده و می توانند در بهبود بعضی از ابعاد آن نقش مثبت داشته باشد.

## کلمات کلیدی:

کیفیت زندگی، سندرم حاد کرونر، آنژیوپلاستی، پیوند عروق کرونر

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/۹۴۷۶۲۷>