

عنوان مقاله:

دژنراسیون ماکولا مربوط به سن

محل انتشار:

هجدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 2

نویسندگان:

تکتم وردکار - کارشناس اپتومتری

زهره محمدی ثانی - کارشناس اپتومتری

خلاصه مقاله:

دژنراسیون ماکولا مربوط به سم (AMD) علت اصلی نابینایی در کشورهای توسعه یافته در افراد بالای 55 سال است که عمدتاً با عوامل خطر و استعداد ژنتیکی همراه است و احتمال ابتلا به آن با افزایش سن زیاد می شود. تشخیص و درمان زودهنگام در افزایش احتمال حفظ ظاهر و عملکرد خوب چشم ضروری است. با این حال، با وجود پیشرفت بسیار در راه های درمان این بیماری، هیچ درمان جراحی در حال حاضر وجود ندارد. مکانیسم پاتوژنز AMD هنوز به وبی مشخص نشده است. در حقیقت، ماهیت چند فاکتوری بیماری، پیچیدگی سیستم بینایی و فرایندهای پیری AMD را به یک بیماری پیچیده تبدیل کرده است که در آن تشخیص صحیح و سریع یک نکته اصلی است. طبقه بندی کلینیکی، AMD را با توجه به شدت ضایعات فوندوس اندازه دروزن ها و ابرمالیتی های پیگمانته، در دو دیسک دیامتر از فووا در افراد بالای 55 سال تقسیم بندی کرده است

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/952873>

