

عنوان مقاله:

مقایسه بلند مدت نتایج موفقیت جراحی احمدوالوگلوکوما در دو گروه رزیدنت و دستیاران چشم با جراحان چشم

محل انتشار:

هجدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

فرشید کریمی - دانشجوی کارشناس ارشد اپتومتری علوم پزشکی مشهد

رامین دانشور - دانشیار گروه چشم پزشکی علوم پزشکی مشهد

خلاصه مقاله:

مطالعه روی پرونده های بیماران مبتلا به گلوکوم مقاومی که در 13 سال اخیر 1393-1383 در بیمارستان خاتم الانبیا مشهد تحت جراحی احمدوالو قرار گرفته و حداقل 4 ماه پیگیری داشتند چشم در این مطالعه وارد شدند رنج پیگیری از 6 ماه تا 60 ماه بود. موفقیت جراحی احمدوالو به عنوان $OP < 21 \text{ mmHg}$ و حداقل 20% کاهش IOP بدون از دست دادن کامل دید و بدون نیاز به دارو یا جراحی مجدد تعریف شد. نتایج قبل و بعد از عمل ثبت و با نرم افزار آماری SPSS و تست Willcoxon مورد آنالیز قرار گرفت. روش: مطالعه روی پرونده های بیماران مبتلا به گلوکوم مقاومی که در 10 سال اخیر 1393-1383 در بیمارستان خاتم الانبیا مشهد تحت جراحی احمدوالو قرار گرفته و حداقل 6 ماه پیگیری داشتند. موفقیت جراحی احمدوالو به عنوان $OP < 21 \text{ mmHg}$ و حداقل 20% کاهش IOP بدون از دست دادن کامل دید و بدون نیاز به دارو یا جراحی مجدد تعریف شد. نتایج قبل و بعد از عمل ثبت و با نرم افزار آماری SPSS و تست Willcoxon مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: میزان موفقیت جراحی در گروه رزیدنت و دستیاران نسبت به جراحان چشم قابل توجه می باشد و میزان موفقیت جراحی در گروه جراحان گلوکوم در مقایسه با جراحان عمومی به نسبت بیشتر است. نتیجه گیری: نتایج قابل مقایسه ای با توجه به میزان موفقیت و عوارض بین جراحان رزیدنت و دستیار در جراحی احمدوالو گلوکوما در پیگیری های طولانی مدت وجود دارد.

کلمات کلیدی:

گلوکوم، احمد والو گلوکوما، فشار داخل چشم

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/952885>

